

Darunavir



Marca comercial: Prezista

Clase de medicamento: Inhibidor de la proteasa

El darunavir, conocido también como Prezista o TMC114, es un medicamento llamado inhibidor de la proteasa. Estos productos funcionan mediante bloqueo de la proteasa, una proteína que necesita el VIH para multiplicarse.

Formas de empleo para el tratamiento del VIH/SIDA

El 23 de junio de 2006, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) autorizó el darunavir para que sea administrado junto con el ritonavir, para uso con otros agentes antirretrovirales para el tratamiento de la infección del VIH en adultos. El darunavir no cura ni previene la infección por el VIH ni el SIDA ni reduce el riesgo de transmisión del virus a otras personas.

En octubre de 2005, Tibotec abrió un programa de acceso ampliado para pacientes con pocas opciones de tratamiento o sin ninguna por causa de fracaso virológico o que no pueden tolerar ciertos regímenes medicamentosos contra el VIH. En el 2006, después de la aprobación del darunavir por parte de la FDA, empezó en Europa otro programa de acceso ampliado. Los pacientes y profesionales de salud pueden visitar el sitio <http://www.tibotec.com> o llamar al teléfono 1-866-889-2074 para obtener más información.

Presentación/Administración

El darunavir se fabrica en tabletas para administración oral y debe tomarse con comida.

Dosis diaria recomendada

La dosis recomendada para adultos es de 600 mg (dos tabletas de 300 mg) tomadas junto con ritonavir de 100 mg dos veces al día con comida. Algunos pacientes se pueden beneficiar de diferentes dosis de darunavir. Los pacientes deben siempre tomar el darunavir tal como se lo receta el médico.

Contraindicaciones

Los pacientes deben informar al médico sobre cualquier problema de salud que tengan antes de tomar este medicamento.

Posibles efectos secundarios

Además de sus efectos deseados, el darunavir puede causar algunos efectos indeseables. Aunque no todos ellos se conocen, se han notificado entre los más comunes casos de diarrea, náuseas, cefalea y síntomas parecidos a los de la gripe, que incluye secreción nasal o dolor de garganta. Las personas deben informar al

médico si experimentan alguno de estos síntomas. Además, se han notificado casos de inflamación del hígado, resultados anormales en las pruebas de la función hepática y altas concentraciones de colesterol y triglicéridos.

Interacción con otros medicamentos y la comida

Es preciso avisar al médico sobre cualquier otro medicamento que tome el paciente, ya sea recetado, de venta libre o natural (a base de hierbas).

Ensayos clínicos que usan o han usado este medicamento

Para obtener información en español acerca de ensayos clínicos que estudian darunavir, visite el sitio web de AIDSinfo: <http://www.aidsinfo.nih.gov/ClinicalTrials> y haga clic en el enlace azul en español al inicio de la página. En la casilla de búsqueda, escriba darunavir. Esta búsqueda está limitada a ciertos ensayos clínicos patrocinados por el gobierno y traducidos al español.

Para hacer una búsqueda más completa de ensayos clínicos para el tratamiento del VIH/SIDA, visite el sitio web de [clinicaltrials.gov](http://www.clinicaltrials.gov) en <http://www.clinicaltrials.gov> para utilizar una base de datos de ensayos clínicos en inglés. En la casilla de búsqueda, escriba Darunavir AND HIV infections.

Fabricantes

Darunavir
Tibotec
1029 Stony Hill Road
Suite 300
Yardley, PA 19067
(609) 730-7500

Prezista
Tibotec
1029 Stony Hill Road
Suite 300
Yardley, PA 19067
(609) 730-7500

Para más información

Comuníquese con su médico o un especialista en

Darunavir



Para más información (cont.)

información sobre salud de AIDSinfo:

- al teléfono: 1-800-448-0440 De lunes a viernes, de mediodía hasta las 5 p.m., hora del este
- al Live Help: http://aidsinfo.nih.gov/live_help De lunes a viernes, de mediodía hasta las 4 p.m., hora del este